

## WAS IST ZU BEACHTEN?

### ALLGEMEINE PRÄOPERATIVE VERHALTENSHINWEISE HINSICHTLICH BLUTVERDÜNNENDER WIRKSTOFFE

- **10 Tage** präoperativ (sofern keine andere individuelle Vereinbarung getroffen wurde) sollte **keine** Einnahme von
  - **Aspirin** (ASS, Acetyl-Salicyl-Säure)
  - **Aspirin-haltigen Medikamenten** (z.B. Grippostad, Thomapyrin)
  - **Diclofenac-** (Voltaren®) oder
  - **Ibuprofen-haltigen** Schmerzmitteln erfolgen.

Paracetamol (z.B. auch ben-u-ron, Doloreduct, Nedolon P, Gelonida, Talvosilen) kann ohne Bedenken als Schmerzmedikament eingenommen werden.

- **Vitamin E** (auch in Multivitaminprodukten, Orthomol®), **Vitamin C** sowie **Ginko-** und **Knoblauch**-haltige Produkte, aber auch Ingwer (als Tee, Bonbon, Beilage Sushi etc.) können eine Blutverdünnung bewirken und somit Blutergüsse oder okuläre Blutungen wahrscheinlicher machen.
- Auch **Alkohol** in größeren Mengen vor der Behandlung kann eine erhöhte Blutungs- und auch Schwellungsneigung verursachen.

Wir bitten Sie, dies vor der Behandlung zu beachten und nach Möglichkeit auf diese Wirkstoffe zu verzichten, um Komplikationen zu vermeiden.

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.